

Råd/information till patienter som undersökts med röntgenkontrastmedel som injicerats i blodbanan

Drick efter undersökningen

Kontrastmedlet utsöndras via njurarna och försvinner ur kroppen på cirka 24 timmar. För att underlätta denna utsöndring bör Ni dricka regelbundet under resten av dagen, cirka 1 dL per timme, tills ni ska gå och lägga er.

OBS! Detta gäller ej om Ni lider av hjärtsvikt, njursvikt eller annat tillstånd som lett till att Ni ordinerats att begränsa Ert intag av vätska.

Om Ni har diabetes och tar medicin som innehåller metformin

Om ni i samband med röntgenundersökningen ordinerats att göra uppehåll i Er mediciner med metformin skall njurfunktionen kontrolleras 2-3 (senast 5) dygn genom ett blodprov (t.ex. kreatinin) innan ni börjar och ta medicinen igen. Tala med Er diabetessköterska, vårdcentral eller läkare om detta om Ni inte redan fått en remiss för ett sådant blodprov.

Allergisk senreaktion

I sällsynta fall kan läkemedel och även kontrastmedel ge upphov till en fördröjd allergisk reaktion. Vanligast är hudutslag och/eller klåda inom något eller några dygn efter undersökningen. I allmänhet är dessa symtom lindriga och försvinner spontant utan behandling. *Om du mot förmodan skulle få en sådan reaktion är det viktigt att du ringer (tel. nr.....) och meddelar oss detta!*

Får du besvärande klåda kan du köpa Zyrlex receptfritt på apoteket. Hjälper inte detta eller om du upplever reaktionen som besvärande ur andra synpunkter eller om hudblåsor skulle uppstå ska du ta kontakt med din läkare, sjukvårdsrådgivningen, primärvården eller akutmottagning. Berätta att du varit på en undersökning och fått röntgenkontrastmedel insprutat i blodet. *Du kan informera röntgen i efterhand i fall du behöver omedelbar vård.*